

I already got pumped...*now what?*

- If you already got pumped, go to the doctor at least once a month to get checked out for any signs of blood clots, infections, or shifting of the silicone.
- Doctors can probably not safely remove substances injected into you without putting you at further risk, but they can monitor you for future complications.
- Doctors still don't know the long-term consequences of getting pumped, so make sure your doctor stays educated and check in with your doctor frequently in case they have new information.

What are the criminal or legal consequences of getting pumped?

If you pump someone and they get sick or even die, you could be prosecuted for several crimes, such as:

- Practicing Medicine Without a License
- Aggravated Second Degree Battery
- Negligent Homicide
- Manslaughter
- Murder

If you are there when someone else is getting pumped or help someone get pumped, you could be charged with being *an accessory or accomplice*.

If you know someone who is wanted on one of these charges and help them avoid the police, you could be charged with being *an accessory or accomplice*.

Want more information?

**Drop-In Clinic
Up to Age 24
Ask for Dr. Sue
611 N Rampart
(504) 584-1112 (or 1119)**

**Ruth U. Fertel/Tulane
Community Health Center
All ages
711 N. Broad (at Orleans)
(504) 609-3500**

**Women With a Vision
1001 S. Broad St. #200
(504) 301-0428**

* This is not medical advice or legal advice. Always consult a professional.



1001 South Broad #119
New Orleans, LA 70125
(504) 252-9025
www.youthbreakout.org



*In loving memory of Bre Hall
May your death not be in vain*

Harm Reduction Guide to PUMPING



What is Pumping?

"Pumping" is the practice of injecting silicone or like substances into parts of the body with a needle or "pump." When done outside of a medical facility, there is no way to know what is being injected.

Although you may be told it is "medical-grade silicone," it is more likely to be substances more easily obtained such as:

Fix-a-Flat or Tire Sealant
Industrial-Grade Silicone
Bathroom Sealant
Cement
Fiberglass
Vaseline
Glue

Why do people get pumped?

Without access to quality healthcare and affordable, safer surgical options, combined with societal pressure and poor body image, many people, both men and women, transgender and non-transgender/cisgender, turn to the streets or the "black market" to get the body they want.

There are safer options.

Consult a doctor for more information.

Why is Pumping Dangerous?

- Those who provide pumping services are usually not doctors and have no medical training.
- When injected in the wrong place, substances may move into the bloodstream and enter the lungs.
- Your body may respond to the foreign substance, go into "toxic shock" and begin to shut down.
- You could get an infection, which quickly spreads to other parts of the body, causing death or amputation of limbs.
- Even years after you are pumped, silicone may move around the body, causing disfigurement.



Bre Hall in 2013. Bre was in a coma for nearly a month before dying from silicone that entered into her lungs.

Risks Include:

- Permanent Disfigurement
- Infection
- Blood Clots
- Amputation of Limbs
- Death

How to Recognize the Signs of an Infection

- Localized Swelling and Pain
- Fever
- Bruising
- Hot Skin Above Injection Site
- Hardness of the area
- Difficulty breathing

IF YOU NOTICE ANY OF THESE SIGNS, CALL 911 IMMEDIATELY.

If the dangers of pumping are not enough to stop you:

- Never get pumped alone.
- Have someone with you for at least 24 hours afterward who can recognize signs of infection.
- Make sure needles are clean and new from the package. Make sure the substance is not being drawn up from a big vat that is used over & over and that the needle is not being put back into the container that others used. (HIV, Hep B, & Hep C can be drawn into the vat and then into you or carried by the needle into the container.)
- Sterilize the area first.
- Ask questions about what is being injected into you so you can give the doctors as much information as possible if there is a problem.
- **If you experience a problem, call 911 immediately.** Be honest with paramedics and doctors when they arrive.

Ya me inyectaron... ¿ahora qué?

- Si ya fuiste inyectadx, vé al médico al menos una vez por mes para que te revise cualquier señal de coágulo sanguíneo, infecciones o desplazamiento de la silicona.
- Es probable que lxs médicxs no puedan retirar con seguridad las sustancias inyectadas sin exponerte a mayor riesgo, pero pueden monitorearte para prevenir complicaciones futuras.
- Lxs médicxs aún no son conscientes de las consecuencias a largo plazo de haber sido inyectadx, asegúrate entonces de que tu médicx sea informadx y queda pendiente de obtener mayor información médica reciente.

¿Cuáles son las consecuencias penales o legales de haber sido inyectadx?

Si tú inyecta a alguien y esa persona se enferma o muere, puedes ser procesadx por varios delitos, tales como:

- Practicar la medicina sin licencia
- Lesiones agravadas de segundo grado
- Homicidio por negligencia
- Homicidio sin premeditación
- Asesinato

Su tu estás presente cuando alguien más está siendo inyectadx o ayuda a que alguien sea inyectadx, puedes ser acusadx de auxiliadorx o cómplice.

Si conoces a alguien a quien se busca por alguno de estos cargos y le ayudas a evadir a la policía, puedes ser acusadx de auxiliadorx o cómplice.

¿Deseas mayor información?

Clínica sin cita
Hasta 24 años de edad
Pregunta por la doctora Sue
611 N Rampart
(504) 584-1112 (o 1119)



* Esto no significa recomendación médica o legal.
Siempre consulta a un profesional .

BREAK ★

1001 South Broad #119
New Orleans, LA 70125
(504) 252-9025
www.youthbreakout.org



*En memoria de nuestra amada
Bre Hall*

Guía para la Reducción del Daño en INYECTARSE

BREAK ★

¿Qué es Inyectarse?

“Inyectarse” es la práctica de inyectar silicona o sustancias similares en partes del cuerpo con una aguja o “bomba”. Cuando se hace por fuera de instalaciones médicas, no hay manera de saber lo que se está inyectando.

Aunque se te diga que es silicona “de grado médico”, es más probable que se trate de sustancias que se obtiene fácilmente como:

“Fix-a-Flat” o sellantes para llantas

Silicona de grado industrial

Sellante para baños

Cemento

Fibra de vidrio

Vaselina

Pegamento

¿Por qué las personas se hacen inyectar?

Sin acceso a servicios de salud de calidad y costeable, de opciones para cirugías seguras, combinadas con la presión social y una imagen pobre del propio cuerpo, muchas personas, hombres y mujeres, transgenerxs y no transgeneros/cisgénero, recurren a las calles o al “mercado negro” para conseguir el cuerpo que desean.

Hay opciones más seguras.

Para mayor información, consulta a unx médicx. Comunícate con BreakOUT! si deseas información sobre medicxs amigables con las personas trans en el área de Nueva Orleáns.

info@youthbreakout.org
(504) 252-9025

¿Por qué es peligroso el inyectarse?

- Quienes ofrecen el servicio de inyección generalmente no son medicxs ni tienen capacitación médica.
- Cuando se inyectan en el lugar equivocado, las sustancias pueden entrar al torrente sanguíneo y llegar a los pulmones..
- Tu cuerpo puede responder a la sustancia externa, entrar en shock tóxico y empezar a apagarse..
- Puedes atrapar una infección que rápidamente puede alcanzar a otras partes del cuerpo, causándote dolor o amputación de miembros .
- **Incluso años después de haber sido inyectadx**, la silicona puede desplazarse por el cuerpo ocasionando desfiguración .



Bre Hall en 2013. Bre estuvo en coma durante casi un mes antes de morir a causa de silicona que entró a sus pulmones.

Posibles riesgos:

- Deformidad permanente
- Infección
- Coágulos sanguíneos
- Amputación de miembros
- Muerte

¿Cómo reconocer las señales de una infección?

- Inflamación y dolor localizado
- Fiebre
- Moretones
- Piel caliente en el sitio de inyección
- Endurecimiento del área
- Dificultad para respirar

SI NOTAS ALGUNA DE ESTA SEÑALES, LLAMA INMEDIATAMENTE AL 911

Si los riesgos de inyectarse no son suficientes para detenerTe :

- Nunca esté solx cuando te inyectas.
- Ten compañía capaz de reconocer las señales de una infección durante al menos 24 horas.
- Asegúrate de que las agujas estén limpias y nuevas sacadas del paquete. Asegúrate de que la sustancia no se obtiene de un contenedor grande que se usa una y otra vez y que la aguja no se regresa al contenedor que otrxs usaron. (VIH, Hep B y C pueden haberse filtrado al contenedor y luego a tí, o traspasado de la aguja al contenedor.)
- Esteriliza al área primero.
- Haz preguntas sobre lo que se te inyecta de manera que si se presenta algún problema puedas darle la mayor información posible a lxs medicxs.
- **Si experimentas algún problema, llama inmediatamente al 911.** Sé honestx con el personal médico y paramédico cuando lleguen.